

ADDOME: QUADRANTI SUPERIORI E INFERIORI DX E SX (LINEE: STERNO → PUBE, OMBELICO ORIZZONTALE)

BPCO = ENFISEMA POLMONARE O BRONCHITE CRONICA

- LEGGERA DISPNEA → NIENTE
- DISPNEA → OSSIGENO A BASSI FLUSSI (RISCHIO BASSO DI ARRESTO RESPIRATORIO)
- ALTRE PATOLOGIE? (INFARTO) DARE LA PRECEDENZA A QUESTE DAL MOMENTO CHE IL RISCHIO DI ARRESTO RESPIRATORIO E' BASSO

ASMA → OSSIGENO AL BISOGNO

IPERVENTILAZIONE → DI SOLITO ANSIA E STRESS, ATTI RESPIRATORI FREQUENTI E SUPERFICIALI, SATURAZIONE 100 %, RESPIRARE IN UN SACCHETTO O MASCHERINA, ATTENZIONE AD ALTRI SINTOMI (PUO' ESSERE ASSOCIATA AD UN INFARTO)

DIABETE:

COMA DIABETICO (IPERGLICEMIA) → SOPRA I 120

- 1) PASTO ABBONDANTE, DIABETE SCONOSCIUTO, DIMENTICATA L'INSULINA
- 2) CARENZA DI INSULINA, ACCUMULO DI GLUCOSIO NEL SANGUE
- 3) + ZUCCHERI NEL SANGUE - INSULINA

CRISI IPOGLICEMICA (IPOGLICEMIA) → SOTTO 60

- 1) VOMITO, PASTO INSUFFICIENTE, SFORZI
- 2) CONSUMO ECCESSIVO DI ZUCCHERI (GLUCOSIO)
- 3) - ZUCCHERI NEL SANGUE + INSULINA

DAE

- TASTO VERDE = ACCESO - TASTO ROSSO = SCARICA
- SE ARRIVA MSA: AD OLTRANZA; ALTRIMENTI 3 ANALISI; IN ITINERE: UN'ANALISI
- PIASTRE CON CAVI VERSO IL BASSO

GRAVIDA → SUL FIANCO SX

TELINO TERMICO – STERILE: ORO SU PELLE SE USTIONATO - ORO FUORI SE IPOTERMIA

TRAUMA ARTO INFERIORE

- SPESSO ARTO PIU' CORTO
- ROTAZIONE VERSO L'ESTERNO → LUSSAZIONE ANTERIORE DELL'ANCA, FRATTURA FEMORE
- ROTAZIONE VERSO L'INTERNO, GINOCCHIO PIEGATO → LUSSAZIONE POSTERIORE DELL'ANCA, PIU' RARO FRATTURA FEMORE

COLONNA VERTEBRALE → CERVICALE, DORSALE, LOMBARE, SACRALE, COCCIGE

CRANIO → FRONTALE, PARIETALE, OCCIPITALE, TEMPORALE

ARTO SUPERIORE → Omero, RADIO + ULNA

ARTO INFERIORE → FEMORE, TIBIA + PERONE

VASI SANGUIGNI

- COLLO → ARTERIE = CAROTIDE INTERNA, ESTERNA, COMUNE  
VENE = GIUGULARE INTERNA ED ESTERNA
- CUORE → ARTERIE = CORONARIA DESTRA E SINISTRA
- ADDOME → ARTERIA = AORTA  
VENA = CAVA
- ALTRE → ARTERIE = ARTO INF. FEMORALE, POPLITEA  
ARTO SUP. SUCCLAVIA, BRACHIALE, RADIALE

SCALA DI GLASGOW →

APERTURA OCCHI → MAX 4 PUNTI  
RISPOSTA VERBALE → MAX 5 PUNTI  
RISPOSTA MOTORIA → MAX 6 PUNTI

MCE →

ADULTI 30 : 2                      BAMBINI < 8 ANNI                      15 : 2

SINTOMI INFARTO →

DISPNEA, TOSSE CON SPUTI, TACHICARDIA + ARITMIA (A VOLTE BRADICARDIA), PRESSIONE RIDOTTA (50% DEI CASI), AUMENTATA (25 %), DOLORE TORACICO, COLLO, BRACCIA (SX), SCHIENA, ZONA EPIGASTRICA, DOLORE PERDURANTE E RESISTENTE ALLA NITROGLICERINA, SUDORAZIONE ABBONDANTE, A VOLTE INFARTI "SILENZIOSI"

ICTUS →

CAUSE: TROMBOSI (ISCHEMICO) O EMORRAGIA (EMORRAGICO)

USTIONI →

TERZO GRADO (+ GRAVE) – REGOLA DEL NOVE

