

CUMADIN

Profilassi e terapia dell'embolia polmonare, della trombosi venosa profonda, della tromboembolia arteriosa associata a fibrillazione atriale cronica, a protesi valvolari cardiache meccaniche o biologiche, a trombosi murale intracardiaca, a infarto miocardico acuto. Profilassi del reinfarto.

LASIX

Tutte le forme di edemi di genesi cardiaca; ascite in seguito a cirrosi epatica, ostruzione meccanica od insufficienza cardiaca; edemi di origine renale (nella sindrome nefrosica anche in combinazione con ACTH o corticosteroidi); edemi periferici. Ipertensione di grado leggero o medio.

TRINITRINA

Trattamento dell'attacco acuto di angina pectoris.

VENTOLIN

Trattamento dell'asma bronchiale, broncopatia ostruttiva con componente asmatica.

GARDENALE

Gardenale è indicato principalmente come sedativo generale, con particolare riguardo all'epilessia e a tutte le condizioni che richiedono una sedazione di lunga durata. Gardenale è particolarmente utile nelle convulsioni tonico-cloniche del grande male e nelle convulsioni corticali focali. Può essere usato come ipnotico e nella detossificazione dal barbiturismo cronico.

PLASIL

Medicina generale: disturbi gastrici da medicinali come antimitotici, antibiotici, chemioterapici (PAS, etionamide in particolare), digitalici, morfina e codeina, ecc.; vomito da stati acidotici ed iperazotemici; cefalee digestive, cefalee e disturbi digestivi del periodo mestruale; disturbi digestivi psicosomatici in soggetti ansiosi in surmenage, ecc. Gastroenterologia: gastriti, sindromi dispeptico-enterocolitiche, coadiuvante nelle ulcere gastriche e duodenali; spasmi del piloro, disturbi da ptosi gastrica; discinesie e calcolosi biliari, disturbi digestivi nei cirrotici; postumi di colecistectomia e gastrectomia.

BUSCOPAN

Trattamento sintomatico delle manifestazioni spastico-dolorose del tratto gastroenterico e genito-urinario. Coliche.

ADALAT

Trattamento della cardiopatia ischemica, angina pectoris cronica-stabile (angina da sforzo), angina pectoris vasospastica (angina di Prinzmetal, angina variante). Trattamento dell'ipertensione arteriosa, Trattamento delle crisi ipertensive, Trattamento della Sindrome di Raynaud.

ANTRA

Trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagiti da reflusso. Trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da Helicobacter pylori. Trattamento nonché prevenzione delle recidive dell'esofagite da reflusso e della malattia da reflusso gastro-esofageo. Sindrome di Zollinger-Ellison.

AMOXICILLINA

Infezioni da germi sensibili all'amoxicillina a carico di differenti organi ed apparati; infezioni delle alte vie respiratorie (tonsilliti, faringiti, laringiti, sinusiti); infezioni delle basse vie respiratorie (tracheobronchiti, bronchiti acute e croniche, broncopolmoniti, polmoniti, bronchiectasie, ascessi polmonari); infezioni otomastoidee; infezioni dell'apparato uro-genitale ed infezioni venereologiche; infezioni enteriche ed apato biliari, salmonellosi; altre infezioni, tra cui endocarditi, sepsi, infezioni chirurgiche, infezioni dermatologiche.

ROIPNOL

Trattamento a breve termine dell'insonnia. Ansiolitico e antidepressivo.

NARCAN

Antidoto nel trattamento delle intossicazioni acute da analgesici, narcotici. Si tenga presente che i sintomi dell'intossicazione acuta da oppioidi sono rappresentati da: depressione respiratoria, stato comatoso (precoma o coma vigile e nei casi più gravi di tipo profondo) miosi pupillare (assente in caso di assunzione contemporanea di sostanze ad effetto midriatico, nei casi di intossicazione acuta da meperidina e negli stati terminali del coma).

NORVASC

Norvasc (amlodipina) è indicato nel trattamento dell'ipertensione e può essere usato nella maggior parte dei casi in monoterapia. I pazienti non adeguatamente controllati con un solo antiipertensivo possono trarre beneficio dall'aggiunta di Norvasc (amlodipina). Il farmaco è stato infatti usato in associazione con diuretici tiazidici, beta-bloccanti o inibitori dell'enzima di conversione. Norvasc (amlodipina) è indicato nel trattamento di primo impiego dell'angina pectoris, sia nei casi dovuti a stenosi cronica (angina stabile), e/o in quelli conseguenti a vasocostrizione o vasospasmo coronarico (angina di Prinzmetal o variante). Norvasc (amlodipina) può quindi essere usato nei casi in cui il quadro clinico suggerisce una possibile componente vasospastica anche se non vi sono evidenti conferme di tale situazione clinica. Norvasc (amlodipina) può essere usato in monoterapia, o in associazione con altri farmaci antianginosi, in pazienti con angina refrattaria al trattamento con nitrati o con beta-bloccanti.

ATROPINA

Spasmolitico in diverse patologie come tratto gastrointestinale, asma, certe forme costipative, tosse canina, spasmi vasali, coliche, epilessia, midriatico in oftalmologia, antidoto per vari avvelenamenti

LIDOCAINA

Farmaco per anestesie per infiltrazione loco-regionale.

CARDIOASPIRINA

Prevenzione della trombosi coronarica dopo infarto del miocardio, in pazienti con angina pectoris instabile, angina stabile cronica ed in pazienti con fattori di rischio multipli (ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, obesità, diabete mellito e familiarità per cardiopatia ischemica). Profilassi degli eventi ischemici occlusivi in pazienti con attacchi ischemici transitori (TIA) e dopo ictus cerebrale. Prevenzione della riocclusione dei by-pass aorto-coronarici, e nell'angioplastica coronarica percutanea transluminale (PTCA). Prevenzione della trombosi durante circolazione extracorporea, nei pazienti in emodialisi e nella sindrome di Kawasaki.

CARVASIN

Insufficienza coronarica, prevenzione e cura dell'angina pectoris. Il Carvasin sublinguale per la sua rapidità d'azione, può essere indicato nella cura dell'angina di petto; per la durata della sua azione, di circa 2 ore, è indicato nella prevenzione dell'attacco di angina quando ci si impegna in uno sforzo che può provocare l'attacco (attività muscolare, atto sessuale, pasto abbondante). Il Carvasin per uso orale, di azione meno rapida, ma più prolungata, è indicato nella prevenzione degli attacchi di angina di petto e nella terapia dell'insufficienza coronarica.

BRUFEN

Come antireumatico in: osteoartrosi in tutte le sue localizzazioni (artrosi cervicale, dorsale, lombare; artrosi della spalla, dell'anca, del ginocchio, artrosi diffusa, ecc.), periartrite scapolo-omerale, lombalgie, sciatalgie, radicolo-nevriti; fibrositi, tenosinoviti, miositi, traumatologia sportiva; artrite reumatoide, morbo di Still. Come analgesico in forme dolorose di diversa eziologia.

ADRENALINA

L'adrenalina o epinefrina (insieme alla noradrenalina) è un ormone e un neurotrasmettitore rilasciato dal corpo in situazioni di stress. Viene correntemente usata nella terapia dello shock anafilattico, dell'arresto cardiaco ed aggiunta agli anestetici locali per ritardarne l'assorbimento.

AUGMENTIN

Augmentin è indicato per la terapia di infezioni batteriche sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle: infezioni delle vie respiratorie ed infezioni otomastoidee; infezioni delle vie uro-genitali; infezioni della pelle e dei tessuti molli; infezioni ginecologiche; infezioni enteriche e delle vie biliari.

CARDIOASPIRIN

ACIDO ACETILSALICILICO

INDICAZIONI Prevenzione della trombosi coronaria: dopo infarto del miocardio, in pazienti con angina pectoris instabile, angina stabile cronica ed in pazienti con fattori di rischio multipli (ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, obesità, diabete mellito e familiarità per cardiopatia ischemica).

Profilassi degli eventi ischemici occlusivi in pazienti con attacchi ischemici transitori e dopo ictus cerebrale.

KRENOSIN

ADENOSINA

INDICAZIONI Rapida conversione a ritmo sinusale delle tachicardie parossistiche sopraventricolari incluse quelle associate a vie accessorie di conduzione (sindrome di Wolff-Parkinson-White).

ADRENALINA

ADRENALINA

INDICAZIONI Shock anafilattico. Asma bronchiale acuta.

TEFAMIN

AMINOFILLINA

INDICAZIONI Asma bronchiale. Broncopneumopatie croniche ostruttive. Asma cardiaco. Cuor polmonare.

CORDARONE

AMIODARONE CLORIDRATO

INDICAZIONI Terapia e prevenzione di gravi disturbi del ritmo resistenti alle altre terapie specifiche. Tachicardie parossistiche sopraventricolari reciprocanti come in corso di sindrome di Wolff-Parkinson-White. Extra sistoli e tachicardie ventricolari. Trattamento profilattico delle crisi da angina pectoris.

TRACRIUM

ATRACURIO BESILATO

INDICAZIONI Bloccante neuromuscolare non depolarizzante da utilizzare in anestesia per facilitare l'intubazione tracheale e per ottenere il rilasciamento muscolare in un vasto ambito di procedure chirurgiche che lo richiedono e nella ventilazione controllata. Mantenimento del rilasciamento muscolare durante l'intervento di taglio cesareo.

ATROPINA SOLFATO

ATROPINA SOLFATO

INDICAZIONI Medicazione preanestetica per prevenire secrezione salivare o bronchiali. Per ristabilire l'attività muscolare al termine di interventi operatori quando sono stati usati anticolinesterasi. Per prevenire disritmie cardiache in chirurgia, spasmi del tratto gastrointestinale e urogenitale e come antidoto in caso di avvelenamento da anticolinesterasici (insetticidi inibitori della colinesterasi, Amanita muscaria) Bradicardia e blocchi AV vagali.

CLENIL

BECLOMETASONE DIPROPIONATO

INDICAZIONI Controllo della evoluzione della malattia asmatica e delle condizioni di broncostenosi. Riniti allergiche e vasomotorie. Afezioni infiammatorie delle cavità nasali e del tratto rinofaringeo.

CALCIO CLORURO

CALCIO CLORURO

INDICAZIONI Ipocalcemie, iperkaliemia con segni ECG di tossicità cardiaca e quando è richiesta la somministrazione di ioni calcio. Nella intossicazione da magnesio. Nella rianimazione cardiopolmonare quando esiste inadeguata contrazione in seguito e defibrillazione o a iniezioni di epinefrina.

TRIMETON

CLORFENAMINA MALEATO

INDICAZIONI Prevenzione e trattamento dei fenomeni allergici: congiuntiviti, riniti, dermatiti (orticaria), punture di insetti, dermatite atopica, terapia coadiuvante delle reazioni allergiche da farmaci, da siero o da vaccini, terapia delle chinetosi e del vomito.

ENTUMIN

CLOTIAPINA

INDICAZIONI Psicosi acute e croniche. Schizofrenia. Stati di eccitamento psicomotori. Episodi deliranti. Accessi maniacali.

VALIUM

DIAZEPAM

INDICAZIONI Ansia. Insonnia.

DOPAMINA

DOPAMINA CLORIDRATO

INDICAZIONI Stati di shock di qualsiasi natura.

FENTANEST

FENTANIL CITRATO

INDICAZIONI Nella premedicazione in qualsiasi tipo di anestesia (anche locale) sia nel decorso postoperatorio come durante l'intervento stesso. Si consiglia l'associazione con il protossido d'azoto e con un neurolettico (droperidolo) che ne migliora l'attività analgesica e ne riduce gli effetti collaterali, realizzando così la neuroleptoanalgesia. Può essere associato, a dosi opportunamente ridotte, anche ai barbiturici ed ai comuni anestetici volatili.

ANEXATE

FLUMAZENIL

INDICAZIONI È indicato per neutralizzare gli effetti sedativi centrali delle benzodiazepine.

LASIX

FUROSEMIDE

INDICAZIONI Edemi cardiaci, da insufficienza renale, nel cirrotico, ipertensione arteriosa.

GLUCOSIO

GLUCOSIO (destrosio) MONOIDRATO

INDICAZIONI Terapia reidratante quando è necessario un apporto calorico, specie in pazienti che non necessitano di sali o in cui questi vadano evitati. Ripristino delle condizioni ematiche di glucosio in caso di ipoglicemia.

FLEBOCORTID

IDROCORTISONE EMISUCCINATO SODICO

INDICAZIONI Asma bronchiale, allergopatie gravi, artrite reumatoide, collagenopatie, dermatosi infiammatorie, neoplasie del tessuto linfatico, sindrome nefrosica, colite ulcerosa, ileite terminale, pemfigo, sarcoidosi, cardite reumatica, spondilite anchilosante, anemia emolitica, porpora trombocitopenica.

ATEM

IPRATROPIO BROMURO

INDICAZIONI Asma bronchiale, broncopneumopatia cronica ostruttiva con componente asmatica.

CARVASIN

ISOSORBIDE DINITRATO

INDICAZIONI Crisi anginosa, angina instabile, cardiopatia ischemica.

IBIFEN

KETOPROFENE

INDICAZIONI Trattamento sintomatico di episodi dolorosi acuti in corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscoloscheletrico.

TRANDATE

LABETALOLO CLORIDRATO

INDICAZIONI Ipertensione arteriosa.

LIDOCAINA CLORIDRATO

LIDOCAINA CLORIDRATO

INDICAZIONI Profilassi e trattamento delle aritmie ventricolari in fase acuta. In ogni tipo di anestesia periferica: infiltrazione locale, tronculare, locoregionale, blocco simpatico.

FLECTADOL	LISINA ACETILSALICILATO
------------------	--------------------------------

INDICAZIONI Dolore, flogosi articolare, iperpiressia.
Tutti gli stati di iperaggregabilità piastrinica.

MAGNESIO SOLFATO	MAGNESIO SOLFATO
-------------------------	-------------------------

INDICAZIONI Trattamento delle crisi convulsive nell'eclampsia.
Prevenzione e controllo degli attacchi convulsivi nella grave tossiemia gravidica.
Controllo di attacchi convulsivi in corso di encefalopatia ipertensiva in corso di glomerulonefrite, specie se associati a basse concentrazioni plasmatiche di Mg⁺⁺.
Trattamento di deficit acuto di magnesio associato con diversi stati patologici (sindrome da malassorbimento, alcoolismo, cirrosi, pancreatiti, acute o croniche) esprimendosi con tetania. Nella prevenzione dei deficit da magnesio nei soggetti sottoposti a nutrizione parenterale totale. Nel trattamento di stati clinici che si giovano della somministrazione di ioni magnesio, nelle aritmie ipercinetiche sopraventricolari e ventricolari. Prevenzione delle aritmie associate con la intossicazione digitalica e della fase acuta dell'infarto del miocardio.

NOVALGINA	METAMIZOLO SODICO	(DIPIRONE MONOIDRATO)
------------------	--------------------------	------------------------------

INDICAZIONI Terapia sintomatica delle affezioni febbrili, delle nevralgie, e del dolore di qualsiasi natura.

SOLUMEDROL	METILPREDNISOLONE EMISUCCINATO SODICO
-------------------	----------------------------------------------

INDICAZIONI Asma bronchiale, allergopatie gravi, artrite reumatoide, collagenopatie, dermatosi infiammatorie, neoplasie del tessuto linfatico, sindrome nefrosica, colite ulcerosa, ileite terminale, pemfigo, sarcoidosi, cardite reumatica, spondilite anchilosante, anemia emolitica, porpora trombocitopenica.

SUPRESOL	METILPREDNISOLONE EMISUCCINATO SODICO
-----------------	----------------------------------------------

INDICAZIONI Disordini endocrini, malattie del collagene, alterazioni dermatologiche, stati allergici, malattie gastrointestinali.

Può essere usato anche nelle seguenti condizioni:

-febbre reumatica acuta, neurodermite generalizzata, shock grave, stati infettivi con grave tossiemia, ustioni esofagee, controllo di gravi affezioni allergiche non rispondenti alle terapie convenzionali.

PLASIL

METOCLOPRAMIDE CLORIDRATO

INDICAZIONI Disturbi dispeptici in assenza di lesioni organiche del tubo digerente.
Reflusso gastro esofageo.

IPNOVEL

MIDAZOLAM

INDICAZIONI Via i.m.: premedicazione prima di interventi chirurgici.
Via e.v.: induzione e mantenimento dell'anestesia.

MORFINA CLORIDRATO

MORFINA CLORIDRATO

INDICAZIONI Dolori cronici intensi e/o resistenti agli altri antidolorifici, in particolare dolori di origine cancerosa. Infarto del miocardio. Edema polmonare acuto.

NARCAN

NALOXONE CLORIDRATO

INDICAZIONI Antidoto nel trattamento delle intossicazioni acute da analgesici, narcotici.

ADALAT

NIFEDIPINA

INDICAZIONI Cardiopatia ischemica, ipertensione arteriosa.

PERGANIT

NITROGLICERINA

INDICAZIONI Angina instabile, angina variante, angina di Prinzmetal. Insufficienza ventricolare sinistra acuta susseguente o meno ad infarto miocardico acuto in particolare con elevata pressione di riempimento e con gettata cardiaca ridotta. Edema polmonare acuto e pre-edema polmonare. Crisi ipertensiva.

SYNTOCINON

OXITOCINA

INDICAZIONI Induzione medica del travaglio di parto. Emorragie post partum.

POTASSIO CLORURO

POTASSIO CLORURO

INDICAZIONI Nel trattamento delle deficienze di potassio quando la reintegrazione per via orale non è possibile.

**RINGER
ACETATO**

**SODIO CLORURO / POTASSIO CLORURO / CALCIO
CLORURO / SODIO ACETATO**

INDICAZIONI Terapia sostitutiva delle perdite di fluidi extracellulari ed elettroliti, quando è necessario correggere stati acidotici lievi e moderati ma non gravi.

BRONCOVALEAS

SALBUTAMOLO

INDICAZIONI Asma bronchiale. Broncopatia ostruttiva con componente asmatica.

SODIO BICARBONATO 8,4%

SODIO BICARBONATO

INDICAZIONI Nel trattamento degli stati di acidosi metabolica e nelle intossicazioni da barbiturici, salicilati, alcool metilico, nelle sindromi emolitiche, nelle sindromi rabdomiolitiche e nelle iperuricemie. È indicato nelle perdite intestinali di bicarbonato (diarrea) e nello shock.

SOLUZIONE FISIOLÓGICA – SODIO CLORURO 0,9%

SODIO CLORURO

INDICAZIONI Terapia degli stati patologici in cui è necessario reintegrare l'osmolarità fornendo ioni sodio e cloro.